

## PREPARACIÓ BIÒPSIA DE PRÒSTATA

**Si és al·lèrgic als antibiòtics o a la penicil·lina contacti amb nosaltres al 932 522 523 abans d'iniciar la preparació**

### MEDICACIÓ NECESSÀRIA:

**Enema Casen 250cc. 2 envasos  
Cefuroxima 500 mg (caixa de 14 comprimits)**

### ABANS DE LA BIÒPSIA:

- Si pren antiagregants: Aspirina, Adiro 300, AAS 300, Bioplak, Plavix, Clopidogrel... **SUSPENDRE'LS 7 dies ABANS de la biòpsia.**
- Si pren anticoagulants: Sintrom, acenocumarol, Aldocumar, Warfarina, Pradaxa, Dabigatran, Eliquis, Apixaban, Xarelto, Rivaroxaban **HA D'ANAR AL SEU CENTRE D'HEMOSTÀSIA per rebre la pauta de suspensió/reinici de la medicació.**
- **La NIT ANTERIOR posar-se un ENEMA CASEN.**
- **El MATÍ de la biòpsia EN DEJÚ, prendre 1 comprimit de Cefuroxima 500 mg (amb un glopet d'aigua) i posar-se un ENEMA CASEN.**
- **Ha de venir ACOMPANYAT.**
- **NO PODRÀ CONDUCR FINS 24 HORES DESPRÉS DE LA SEDACIÓ.**

### DESPRÉ DE LA BIÒPSIA:

- **Continuant prenent 1 comprimit de Cefuroxima 500 mg cada 12 hores fins acabar la caixa.**
- **Pot sagnar amb la orina, femta i semen durant dies.**
- **Si té més de 38º de febre vagi a urgències.**
- **Si pren antiagregant, pot reiniciar-lo al dia següent de la prova.**
- **Si pren anticoagulant reiniciar-lo segons la pauta d'hemostàsia.**