

## PREPARACIÓN BIOPSIA DE PRÓSTATA

Si es alérgico a los antibióticos o la penicilina contacte con nosotros en el 932 522 523 antes de iniciar la preparación.

### MEDICACIÓN NECESARIA:

**Enema Casen 250cc. 2 envases**  
**Cefuroxima 500 mg (caja de 14 comprimidos)**

### ANTES DE LA BIOPSIA:

- Si toma antiagregantes: Aspirina, Adiro 300, AAS 300, Bioplak, Plavix, Clopidogrel... SUSPENDERLOS 7 días ANTES de la biopsia.
- Si toma anticoagulantes: Sintrom, acenocumarol, Aldocumar, Warfarina, Pradaxa, Dabigatran, Eliquis, Apixaban, Xarelto, Rivaroxaban DEBE ACUDIR A SU CENTRO DE HEMOSTASIA para recibir la pauta de suspensión/reinicio de la medicación.
- La NOCHE ANTERIOR ponerse un ENEMA CASEN.
- La MAÑANA de la biopsia EN AYUNAS, tomar 1 comprimido de Cefuroxima 500 mg (con un sorbo de agua) y ponerse un ENEMA CASEN.
- Se ha de acudir con un ACOMPAÑANTE.
- NO PODRÁ CONDUCIR HASTA 24 HORAS DESPUÉS DE LA SEDACIÓN.

### DESPUÉS DE LA BIOPSIA:

- Continuar tomando 1 comprimido de Cefuroxima 500 mg cada 12 horas hasta terminar la caja.
- Puede sangrar con la orina, heces y semen durante varios días.
- Si fiebre mayor de 38º acudir a urgencias.
- Si toma antiagregante, puede reiniciarlo al día siguiente de la prueba.
- Si toma anticoagulante reiniciarlo según la pauta de hemostasia.